

ICS 65.020.20  
B 05

# CGAPA

T/CGAPA XXX—XXXX

---

Technical specification for cultivation of water bamboo in Dabie Mountains



× × × × - × × - × ×

× × × × - × × - × ×

---

件依 T/CAS 1.1—2017《体准 写南》关 写。  
件中 些 及专利。中 优 农产 务协会不 任何  
专利 别。  
件 任公 出。  
件 中 优 农产 务协会 。  
件 单位： 任公 、 、六  
务 公 、六 区 、 、 县 农 、六 农业农  
。  
件 人： 厚 、 、 军、刘丽、冯 利、 。  
件 制 。

1

准 了 产产 、 使 、 、 、 ，  
及农 使 。  
准 于 别 区 。

2

下列 件中 内 中 件 不 。其中，  
件，仅 于 件；不 件，其 （包  
修 单） 于 件。  
GB 2763 全 准 中农  
GB 5084 农 准  
GB 8321 农 使 准则（ 分）  
NY 496 使 准则 则  
NY 835  
NY 1276 农 全使 则  
NY 5010 公 农产 业产 件

3

下列 义 于 件。  
NY/T 835 义 于 件。其中： 别 别 内  
为600-1200 之 。

4

4.1

具 候 区，7 ~9 为 21.8℃， 于 12℃。  
一 600m~1200m 以内 区 。

4.2

厚， ，以 为主， 以上，保 保 。  
值 。产 NY/T5010 。

4.3

利 ， 冷 ， 便 ， GB5084 。

## 5

### 5.1

别 单 主 六 、 分 、  
、 产 。 ， 前 别 区 单  
“ 别 1 ~4 ”， “ 6 ~8 ” 以及 “六 ” 。  
前一 ， 中 健 、 、 产 、 不 、 产  
作 。

### 5.2

以上 交 便利、 便、 件 4.2 。  
冷 不 。 冷 ， 先 ， 出 下 。

### 5.3

前7-10d ， ， 到 、 、 ， 作 20-30cm，  
3-5cm。 加 ， 以利保 。  
1.5%以上，保 保 力 ， 以 与 为 ， 养分 、 、  
为1:0.8:1.2。

### 5.4

前 农 ， ~  
， 入 ， 。

### 5.5

， 前，先去 ， ， 10cm~20cm割去 上  
， ， 利刀 1个 、 2个~3个分 为一 分 ， 分 。

### 5.6

单 以10 下 ~11 下 为主， 不 于2 下 前 。  
， 为 50cm、 为 50cm、 为 100 cm， 22500 ~  
27000 / ， 、 原则。 以不 、 不 、  
分 入 中即 。

## 6

### 6.1

15cm~20cm ， 、 ， 上去劣 ， 保全 。  
保 5-7 。 中 压一 ， 使 分 匀 。

### 6.2

#### 6.2.1

保 ~ 冬；

#### 6.2.2

分 ， 保 ， 保 ， 一 ；

#### 6.2.3

分，入，及利冷，促。  
(10h~16h 串“”，以保以上，以不 为。  
，上，入体保 1cm，以利。

### 6.3

#### 6.3.1

#### 6.3.2

入，

#### 6.3.3

分 势， ~，。

#### 6.3.4

% 再一， ~，。

### 6.4

一 ~，一，以。

### 6.5

以保 8 ~10 为，，及去分。产  
中，及去、，。 ，及剥  
、，以利、光，减。

## 7

### 7.1

主、、。  
主、、。

a) “ 为主、 ” 原则，优先 农业、  
，使化。

b) 农， 剂，优先使 农，全。

### 7.3

与 作 2 ~3 作， 健。、及  
、。及中，。

### 7.4

。 1.33 hm<sup>2</sup>~2hm<sup>2</sup> 内 1。

### 7.5

保 利， 人； 人 丽。  
二化 信， 667m<sup>2</sup> 1个~2个，产使。

。 农 农 。 倡 养 一 养 、  
、 、 、 。  
7.6

农 使 GB/T 8321 NY/T 1276 。 主 况，  
， 严 剂 ( )、 全 ， 倡交 使 不 作  
农 。 主 及 A。

8

8.1

内 ， 即 刚 ， 即 一侧  
0.5cm~1.5cm 为 。

8.2

、 中、 、 ， 个体 匀， ， 、 、 。

8.3

2d~3d 一 。

8.4

于保 ， GB 2763 ， 冷 中 光， 以利  
入保 中 ， 以 。

A

主 农 A. 1。

A. 1

	( )	制剂	倍	使	使	全 (d)
		10%WG 10g/亩	2000-3000 倍	初	1	28
	代	80% WP60g/亩	800 倍	初 分	2	10
		50%WG 12g/亩	300 倍	初	1	10
		50% WG 30g/亩	150 倍	初	1	10
		50%SC 120g/亩	1000 倍	初	2	
	三	20%WP 120g/亩	600 倍	初	1	10
	丙	25%EC 15-20mL/亩	3000-4000 倍	初	1-2, 7	28
		25%EC 50-80mL/亩	800-1000 倍	初	2-3	7
	井冈	5%WP 60g/亩	1000-1300 倍	初 , 10 ~ 15 再 1	2	14
	三	20% WP120g/亩	600 倍	初	1	14
	丙	25%EC 15-20mL/亩	3000-4000 倍	初	1-2, 7	28
		25%EC 50-80mL/亩	800-1000 倍	初	2-3	7
	*	65%WP 15-20g/亩	4000-5000 倍	2~3	1-2	14
		10%WP 6g/亩	2000-3000 倍	2~3	2	28
		10%WP 30g/亩	2000-3000 倍	2~3	2	14
		20%SC 15ml/亩	3000-4000 倍	1代 化	2	10
	丁	5%SC40ml /亩	2000 倍	化	1	10
		2%ME35-50mL/亩	1600-2300 倍	化	2-3	14
		10% WP30g/亩	3000 倍	化	1	7
		25% SC 30g/亩	2500-3000 倍	化	1	10